

POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!



informace pro chovatele



Státní
veterinární
správa

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření

- přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
- trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
- pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
- zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)



Preventivní opatření

- zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
- oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
- umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
- důsledná dezinfekce, dezinfekce a deratizace
- použití bezpečného krmiva a steliva
- použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

www.svscr.cz



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

PTAČÍ CHŘIPKA

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.

Jaké je riziko přenosu ptačí chřipky na člověka?

Riziko přenosu na člověka je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997 popsán. Současná forma viru je schopna infikovat člověka pouze ve výjimečných případech, a to při úzkém styku s napadenou drůbeží. Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím.

Jaké jsou příznaky ptačí chřipky u lidí?

U člověka se nákaza ptačí chřipkou projevuje horečkou, postižením dýchacích cest, zápallem plic, průjmovými onemocněními. Pravděpodobnost onemocnění lidí v našem prostředí však je velmi malá. V podmínkách České republiky jde především o veterinární problém.

Jak se chránit ?

Nejvýznamnější je dodržování zásad osobní hygieny. Důležité je mytí rukou a dezinfekce po každém kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy.

Lidé, kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu s drůbeží, by v případě na podezření z nákazy v chovu měli nosit ochranné pomůcky (pracovní oděv, pokrývku hlavy, která zcela ukryje vlasy, ochrannou obuv, omyvatelné ochranné rukavice a ochranné brýle).

Je třeba mít obavu z konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků?

V České republice jsou všechny chovy drůbeže pod přísným veterinárním dozorem, který pečlivě monitoruje zdravotní stav zvířat. Další navazující kontroly jsou nastaveny v průběhu zpracování produkce. Kontrolou samozřejmě prochází i dovozy zvířat a masa. Není třeba se obávat, že by se na trh dostalo maso z nakažených zvířat. Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát na základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení, apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 °C v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.

Praktické rady

1. Při nálezu hromadného úhynu volně žijícího ptactva informujte místně příslušnou Krajskou veterinární správu, nejbližšího soukromého veterináře nebo Policii ČR.
2. Vyvarujte se styku s nemocnými nebo mrtvými ptáky a upozorněte děti, aby se takových ptáků nedotýkaly. Nevpouštějte ptáky do svého obydlí.
3. Dodržujte zásady osobní hygieny, myjte si pravidelně ruce mýdlem, obzvláště před jídlem. Pozornost věnujte hygieně při vaření.
4. Zajistěte ochranu domácích miláčků – psů, koček, apod. – zabraňte jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky.
5. Při cestování do zemí zasažených virem ptací chřipky dodržujte doporučení vydaná ECDC (Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a Ministerstvem zdravotnictví, tato doporučení najdete na www.mzcr.cz. Nenevštěvujte např. místní trhy s drůbeží.
6. Neobávejte se konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků. Drůbeží maso a vejce důkladně tepelně opračujte (vařením, pečením, apod.), virus je zničen při teplotě 70 °C v jádře potravin, a to již za jednu sekundu.

Další informace naleznete na webových stránkách
Ministerstva zemědělství - www.mze.cz, Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz,
na www.ptaci-chripka.cz a na www.bezpecnostpotravin.cz.

ZABRAŇTE zavlečení ptačí chřipky


**CHRAŇTE SVOJI DRŮBEŽ.
CHRAŇTE SVOJE HOSPODÁŘSTVÍ**

Kontrola přístupu



- **Cizí osoby a vozidla včetně nástrojů a přepravních klecí** do hospodářství vpouštějte pouze v nezbytných případech.
- Uplatňujte dezinfekční opatření u **veškerých osob i věcí**, které vstupují do hospodářství, zejména pokud v nedávné době přišly do kontaktu s drůbeží, vedlejšími živočišnými produkty z drůbeže nebo volně žijícími ptáky.
- Při vstupu do hospodářství vždy noste **čisté oblečení a umyjte si ruce a očistěte obuv**.

Vše dovnitř, vše ven



- Naskladňujte **drůbež stejného stáří** současně a na konci produkčního cyklu je **vyskladňujte společně**. Zvýší se tak efektivita produkce a omezí se návštěvy v hospodářství, čímž se sníží riziko zavlečení nákazy do chovu.

Kompletní vyčištění



- **Pravidelně čistěte a dezinfikujte všechna zařízení**, zejména po každém produkčním cyklu.
- Jasně oddělte „**čisté**“ (v kontaktu se zvířaty) a „**nečisté**“ (v kontaktu s vnějšími plochami) části hospodářství.

Krmivo a voda



- Nepoužívejte krmivo, které mohlo být vystaveno **nečistotám, trusu nebo vlhkosti**.
- Krmivo vždy skladujte v **uzavřených** nebo **vodotěsných nádobách** a podestýlku v uzavřených nebo krytých prostorách, aby nedošlo ke kontaminaci.
- Zajistěte hejnu **čerstvou a čistou zdravotně nezávadnou vodu**.

Zabránění přístupu pro volně žijící ptáky



- V chovných prostorách mějte **pevné střechy, utěsněné stěny a neporušené oplocení**.
- **Nepřemisťujte krmivo mezi jednotlivými hejny** a dbejte na to, aby v okolí hospodářství nebyly rezervoáry stojaté vody.
- Venkovní výběhy chraňte **sítěmi nebo drátěnými zábranami** a **nezapomeňte pravidelně kontrolovat, zda v nich nejsou díry nebo mezery**. Vniknutí volně žijících ptáků mohou pomoci zabránit rovněž plašiče nebo odpuzovače.

Jeden druh, jedno místo



- Různé druhy drůbeže, jako jsou kur domácí, kachny a krůty, **by měly být drženy odděleně**, aby se zabránilo šíření nákazy mezi druhy.

Rozpoznejte příznaky



- Pokud si ve svém hospodářství všimnete čehokoli neobvyklého (snížení příjmu krmiva nebo vody, zvýšených úhynů nebo jiných známek nákazy), **neprodleně to nahláste** soukromému veterinárnímu lékaři nebo krajské veterinární správě.
- Čím dříve začnete jednat, tím větší je šance zastavit šíření ptačí chřipky a **ochránit svůj chov i okolní chovy**.

